

Klerat KB

Kostka woskowa

Pozwolenie MZ nr: 1570/04

Zawartość netto 5kg

PREPARAT NA MYSZY I SZCZURY

Rodentycyd. Preparat przeznaczony do zwalczania gryzoni w formie kostek do bezpośredniego wykładania na bazie mieszaniny produktów zbożowych, wabiących substancji hormonalnych oraz substancji mumifikujących. Zawiera 0,005 % wag. czyli 0,05 g/kg BRODIFACOUM (związek z grupy jednodawkowych antykoagulantów II generacji).

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat należy wykładać w miejscach, gdzie występują gryzoni: w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu. Przy zwalczaniu szczurów, stosować porcje 50 gramów, t.j. 5 kostek w odległości co 5 – 10 metrów. Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 do 30 gramów, t.j. 2 do 3 kostki co 2 – 5 metrów. Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytopienia gryzoni, co następuje po 2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzoni zaczynają padać po 4 – 5 dniach od momentu jednorazowego spożycia trutki.

OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ:

Działa szkodliwie dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia. Jednakże ze względu na zawartość w preparacie Bitrexu (denatonium benzoate), substancji o bardzo intensywnym gorzkim smaku, prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWAŃ

Pozostałości preparatu oraz puste opakowania zebrać i traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środkach we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania zużytych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Padłe gryzoni zebrać starannie i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

S20/21 - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO

MAGAZYNOWANIE:

S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S7/47 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie przekraczającej 40 °C.

S8 - Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S29/35 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a preparat i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

S49 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

OBJAWY ZATRUCIA:

W razie wystąpienia niepokojących objawów (krwotoki i ogólne osłabienie) lub jeśli występuje podejrzenie zatrucia, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, przedkładając lekarzowi oryginalne opakowanie zawierające instrukcję użycia środka lub kartę charakterystyki.

ANTIDOTUM:

Antidotum jest **witamina K1** podana doustnie lub w formie zastrzyku.

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE:

W przypadku, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym, tel.: Gdańsk – 058 349-28-31, Kraków – 012 411-99-99, Poznań – 061 847-69-46, Warszawa -022 619-66-54.

PRODUCENT:

Producent: SOREX Ltd.
St. Michael Industrial Estate
Widnes, Cheshire WA8 8TJ
United Kingdom

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 lata

ZAWARTOŚĆ: 5kg

DATAPRODUKCJI: