

Producent i Dystrybutor:

ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno
tel: 0-prefix-32 617 75 71, fax: 0-prefix-32 615 00 07

Rat Killer Perfekt Pasta

Pozwolenie MZ nr 0340/03 na obrót produktem biobójczym

Środek gryzoniobójczy

Trująca jednodawkowa przynęta pokarmowa w formie pasty, o właściwościach mumyfikujących, przeznaczona do zwalczania szkodników sanitarnych (szczurów i myszy) w pomieszczeniach (lokalach użyteczności publicznej, hotelach, mieszkaniach, zakładach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych i inwentarskich, oborach, chlewniach, mleczarniach itp.) oraz na zewnątrz - w bezpośrednim ich sąsiedztwie, po umieszczeniu jej w stacji deratyzacyjnej.

Zawiera 0,0025 % brodifacoum (związek z grupy antykoagulantów).

**Sposób użycia:**

Preparat (w postaci gotowych do użycia torebek) wykladać, najlepiej w stacjach deratyzacyjnych lub płytkich naczyniach, w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, w miejscach spokojnych i suchych).

Zwalczania szczurów: porcja 4 torebki (ok. 50 g) co 5 - 10 m.

Zwalczanie myszy: porcja 2 torebki (ok. 25 g) co 2 - 5 m.

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do całkowitego wytopienia gryzoni, co następuje po około 2 tygodniach od rozpoczęcia deratyzacji (gryzonie zaczynają padać po 4 - 5 dniach od momentu jednorazowego spożycia trutki).

Środki ostrożności:

1. Preparat wykladać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt i ptaków.
2. Nie umieszczać na powierzchniach, na których przechowywana jest żywność lub spożywane są posiłki oraz tam, gdzie istnieje możliwość skażenia żywności.
3. Podczas wykładania nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
4. Stosować rękawice ochronne.
5. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i zniszczyć je przez spalenie lub zakopać głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.
6. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem.
7. Puste opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.
8. Naczyń, łyżek itp. użytych do rozłożenia trutki nie stosować w gospodarstwie domowym.
9. Miejsca przypadkowego zetknięcia się preparatu ze skórą dokładnie umyć, oczy starannie przepłukać wodą.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w miejscu suchym, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz dla zwierząt, w umiarkowanych temperaturach.

Unikać sąsiedztwa wonnych środków chemicznych.

Pierwsza pomoc:

Po połknięciu lub w razie wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza. Odtrutką jest witamina K₁ podana doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie) wyłącznie pod kontrolą lekarza. Opieka lekarska jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie wróci do normy.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31, Kraków - (0-12) 683 11 34, Lublin - (0-81) 740 89 83,

Łódź - (0-42) 657 99 00, Poznań - (0-61) 847 69 46, Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Rzeszów - (0-17) 853 45 17, Warszawa - (0-22) 619 66 54, Wrocław - (0-71) 343 30 08

Zawartość netto:

Data produkcji:

Data ważności:

Numer serii: